

واکسیناسیون برای اطفال خورد سال

رهنمودی برای والدین

اینها واکسینهای مورد ضرورت طفل خورد سال تان است!

RSV-mAb ¹ از 0 الی 7 ماهگی												HepB	در وقت تولد ^{1,2}
RV + پولیو + Hib + PCV + DTaP + HepB از 1 الی 2 ماهگی ²												2 ماهگی ^{1,2}	
RV + پولیو + Hib + PCV + DTaP + HepB ³												4 ماهگی ^{1,2}	
RV ⁵ + پولیو از 6 الی 18 ماهگی ² + Hib ⁴ + PCV + DTaP + HepB از 6 الی 18 ماهگی ² + کووید ⁷												6 ماهگی ^{1,2}	
HepA ⁸ از 12 الی 23 ماهگی ² + انفلوانزا ⁶ + ابله مرغان از 12 الی 15 ماهگی ² + Hib از 12 الی 15 ماهگی ² + PCV از 12 الی 15 ماهگی ² + DTaP از 15 الی 18 ماهگی ² + MMR از 12 الی 15 ماهگی ²												12 ماهگی و کلانتر ^{1,2}	

با داکتر یا نرس تان چک کنید تا اطمینان حاصل کنید که طفل خورد سال تان همه واکسیناسیونها را طبق پلان دریافت میکند. اکثر اوقات برای کاهش تعداد تزریقات واکسینها با هم مخلوط میگردد. مطمئن شوید که یک کارت واکسین ثبت تاریخ تزریق واکسین برای طفل خورد سال تان درخواست میکنید. در هر نوبت مراجعه، این کارت را با خود بیاورید.

در ذیل لیستی از امراضی است که طفل تان در مقابل آنها محافظت خواهد شد:

RV: عفونت ویروس روتا، مریضی خطرناک اسهال

انفولانزا: عفونت خطرناک شش

MMR: سرخکان، بیخ گوش و چیچک

کووید-19: مریضی خیلی خطرناک و ساری

HepA: هپاتیت A، مریضی خطرناک کبد

ابله مرغان: که به نام وریسلا نیز نامیده میشود

HepB: هپاتیت B، مریضی جدی کبد

DTaP: دیفتیری، تیتانوس، و سیاه سرفه

PCV: واکسین مختلط پنوموکوکل در مقابل عفونتهای خطرناک خون، شش و مغز محافظت میکند

Hib: انفولانزای هموفیلوسنوع b، عفونت خطرناک مغز، گلو، و خون

پولیو: پولیو، مریضی خطرناک فلج کننده

RSV: ویروس سین سیشیل تنفسی، عفونت خطرناک شش

نوتهای درباره چارت فوق:

- از اکتبر الی مارچ، اگر واکسین RSV در دوران حاملگی تزریق نشده باشد، اطفال تازه متولد شده در وقت تولد الی 7 ماهگی ممکن است به انتی بادی و قایوی RSV (RSV-mAb) ضرورت داشته باشند. اطفال تازه متولد شده خاص کلانتر از 8 الی 19 ماهه ممکن است در طول فصل دوم RSV شان به RSV-mAb ضرورت داشته باشند.
- در این محدوده سنی است که این واکسین باید داده شود.
- ممکن است طفل خورد سال تان در سن 4 ماهگی، با توجه به واکسین استفاده شده، به دوز واکسین Hep B ضرورت نداشته باشد. با داکتر یا نرس تان چک کنید.
- ممکن است طفل خورد سال تان در سن 6 ماهگی، با توجه به واکسین استفاده شده، به دوز واکسین Hib ضرورت نداشته باشد. با داکتر یا نرس تان چک کنید.
- ممکن است طفل خورد سال در سن 6 ماهگی، با توجه به واکسین استفاده شده، به دوز واکسین RV ضرورت نداشته باشد. با داکتر یا نرس تان چک کنید.
- تمام اطفال 6 ماهه و کلانتر باید در خزان یا زمستان هر سال در مقابل انفولانزا واکسین شوند.
- طفل تان با توجه به برند واکسین کووید-19 تزریق شده به 2 الی 3 دوز ضرورت خواهد داشت.
- طفل تان به 2 دوز واکسین HepA، در فاصله حداقل 6 ماه از یکدیگر، ضرورت خواهد داشت.

